

GANIKDERMA®

Tipo de Embalagem:

Código do produto	Forma de apresentação/ Dimensão/ Quantidade	Nº de peças/caixa individual
C3010	Compressa impregnada, 10 cm x 10 cm	10
A1501	Aplicador com 15 ml de pomada	1
T020	Tubo com 20 ml de pomada	1
T050	Tubo com 50 ml de pomada	1
T100	Tubo com 100 ml de pomada	1
R500	Recipiente com 500 ml de pomada	1

Apresentação:

A pomada **GANIKDERMA®** é uma preparação tópica com efeito barreira.

Durante a fase inflamatória da cicatrização de feridas, graças à sua ação formadora de película, a pomada ajuda a criar um ambiente húmido propício à remoção natural do tecido necrótico (desbridamento autolítico). A sua ação é física: o produto mantém o exsudato em contacto com o tecido necrótico, promovendo assim a sua separação sem danificar o tecido saudável circundante.

Durante a fase de granulação, a barreira semipermeável formada pela pomada ajuda a manter o equilíbrio hídrico ideal, condição necessária para a formação do tecido de granulação. Além disso, graças às propriedades absorventes do subgalato de bismuto contido na sua formulação, ajuda a controlar o excesso de exsudato que, em grandes quantidades, pode dificultar a cicatrização. O efeito semioclusivo da pomada auxilia as defesas naturais do organismo, limitando a evaporação do exsudato e, assim, prevenindo a formação de crostas secas, que podem retardar a reepitelização.

Por fim, o pH ligeiramente ácido da pomada **GANIKDERMA®** (4,0–5,5) ajuda a manter um microambiente fisiologicamente propício à cicatrização, desfavorável à proliferação de microrganismos que podem comprometer o processo de cicatrização.

Indicações

- Adjuvante no tratamento local de feridas agudas: queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, escoriações, úlceras, feridas traumáticas e outras lesões cutâneas superficiais.
- Adjuvante no tratamento local de cicatrizes patológicas (cicatrizes hipertróficas e queloides).
- Adjuvante no tratamento local de úlceras de pressão, úlceras vasculares crónicas e úlceras do pé diabético.
- Adjuvante no tratamento local após peeling químico ou laser.

- Adjuvante no tratamento local da área dadora durante enxertos de pele.
- Adjuvante no tratamento local da epidermólise bolhosa.
- Adjuvante no tratamento local do eczema húmido, dermatite de contacto, psoríase e radiodermatite.
- Adjuvante no tratamento local de lesões de acne e herpes.

Modo de usar

Antes de cada utilização, recomenda-se lavar e secar bem as mãos com água e sabão. Limpe a ferida com soro fisiológico (0,9% NaCl) ou solução de Ringer antes de cada aplicação da pomada, certificando-se de que qualquer excesso de solução é absorvido. Aplique a pomada em toda a ferida numa camada de 1 a 2 mm. Cubra a ferida com uma compressa estéril e/ou um penso não tecido, fixando-o com um adesivo para pensos. Mude o penso a cada 1 ou 2 dias em úlceras e feridas. Aplicar 3 a 4 vezes por dia em problemas dermatológicos. Recomenda-se o uso de pensos não traumáticos, pois a pomada impede que a gaze adira à pele. Não aplique qualquer outro produto topicamente, pois pode alterar as propriedades terapêuticas da pomada. Continue a aplicação até à completa cicatrização.

Advertências

Este produto é apenas para uso externo; a ingestão pode causar problemas digestivos. Não são conhecidas interações ou incompatibilidades com outros medicamentos. A sua utilização durante a gravidez e a amamentação não foi especificamente estudada; a sua utilização deve ser avaliada por um médico.

GANIKDERMA® não afeta a capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.

Contra-indicações: Hipersensibilidade a qualquer um dos ingredientes.

Efeitos secundários:

Devido ao seu mecanismo de ação, pode ocorrer uma sensação de queimadura ou desconforto local imediatamente após a aplicação, por vezes acompanhada de febre em redor da lesão, que desaparece espontaneamente em 30 a 40 minutos. Pode ocorrer comichão durante o processo de cicatrização. Evite coçar a zona afetada para prevenir irritações e danos no tecido recém-formado. Reação alérgica local a qualquer um dos componentes da pomada.

Não foram relatados casos de sobredosagem. Não há conhecimento de incompatibilidades medicamentosas. Conservar o produto abaixo dos 25°C. O produto não utilizado e os resíduos devem ser eliminados de acordo com as normas locais.

Ingredientes:

Cera de abelha, Óleo de oliva, Óleo de girassol, Calendula, Óleo de rícino hidrogenado, Boswellia, Subglato de bismuto, Resina de pinho, Cânfora.